

آموزش همگانی با موضوع فشارخون انجام شد



به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه، آموزش همگانی آذر ماه به موضوع فشارخون و راههای کنترل آن اختصاص داده شد.

فشار خون بالا تهدیدی جدی محسوب می شود زیرا باعث می شود قلب شدید تر کار کند که نیاز آن به اکسیژن را افزایش داده در ایجاد آنین دخالت دارد در صورتی که این مشکل تحت کنترل قرار نگیرد خطر حمله قلبی ، سکته مغزی و بیماری کلیوی را افزایش می دهد.

علایم شایع : معمولاً علایمی وجود ندارد مگر اینکه بیماری شدید باشد. ولی در شرایط بحرانی به شکل سردد، خواب آلودگی، گیجی ، کرختی و مور مور شدن دستها و پاها ، سرفه خونی، خونریزی از بینی ، تنگی نفس شدید ظاهر می کند.

پیشگیری: در حال حاضر راه خاصی برای پیشگیری از فشارخون بدون علت مشخص وجود ندارد. اگر سابقه خانوادگی فشارخون بالا وجود داشته باشد. فشارخون باید مرتباً کنترل شود.

اما اگر فشارخون بالا زود تشخیص داده شود، همزمان با تغییر رژیم غذایی، ورزش، کنترل استرس، ترک دخانیات، نوشیدن الکل و دارو معمولاً باعث پیشگیری از بروز عوارض می شود زنان باردار نیز باید مرتب برای معاینه پیش از زایمان به پایگاه های بهداشتی درمان و خانه بهداشت مراجعه کنند تا کارشناسان بتوانند به پروفشاری احتمالی خون پی ببرد و به موقع کنترل کنند.

صرف این مواد تا حدود زیادی می تواند از ابتلا یا پیشرفت پروفشاری خون جلوگیری کند :

سبزیجات سبز مصرف کنید
استفاده از شیر بدون چربی بطور روزانه
صرف مغزها و دانه های گیاهی
بطور مداوم گوجه فرنگی مصرف کنید
بهار و سیر به اندازه کافی مصرف کنید
صرف نان سبوس دار و حاوی جو دسر
از غذاهای پر نمک و پر ادویه بپرهیزید
صرف میوه های تازه را در وعده غذایی خود بگنجایید
پرهیز از تنقلات و غذاهای کنسرو شده
پیاده روی و ورزش منظم در طول هفته
از مزایای شکلات تلخ غافل نشوید

کنترل فشارخون در منزل:

هرچند ممکن است شما جهت اندازه گیری فشارخون نیاز به تمرین داشته باشید ولی باید بدانید که اندازه گیری فشارخون کار نسبتاً ساده ای است. در این قسمت راهنمایی هایی برای اندازه گیری دقیق فشارخون در منزل ارائه می شود: در صورتی که سیگار کشیده اید، یا قهوه نوشیده اید، نیم ساعت صبر کنید و بعد فشارخون را اندازه بگیرید. کشیدن سیگار و نوشیدن قهوه هر دو می توانند بطور موقت فشارخون را افزایش دهند.

آرام در حالتی بنشینید که پاهایتان صاف بر روی زمین بوده و پشتتان را به جایی تکیه داده باشید . در حدود 5 دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون با آرامش در چنین وضعیتی بنشینید.

دستتان را ببروی میز یا بر روی دسته صندلی قرار داده و عضلات خودتان را شل کنید. کاف را به آرامی دور بازوی بدون لباس خود پیچیده ، بطوريکه یک انگشت براحتی قادر به لغزش در زیر آن باشد، لبه تحتانی کاف باید در حدود 5/2 متر بالاتر از چین آرنج قرار بگیرد.

در صورتی که سیگار کشیده اید، یا قهوه نوشیده اید، نیم ساعت صبر کنید و بعد فشارخون را اندازه بگیرید. کشیدن سیگار و نوشیدن قهوه هر دو می توانند بطور موقت فشارخون را افزایش دهند.

آرام در حالتی بنشینید که پاهایتان صاف بر روی زمین بوده و پشتتان را به جایی تکیه داده باشید . در حدود 5 دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون با آرامش در چنین وضعیتی بنشینید.

دستتان را ببروی میز یا بر روی دسته صندلی قرار داده و عضلات خودتان را شل کنید. کاف را به آرامی دور بازوی بدون لباس خود پیچیده ، بطوريکه یک انگشت براحتی قادر به لغزش در زیر آن باشد، لبه تحتانی کاف باید در حدود 5/2 متر بالاتر از

چن آرنج قرار بگیرد.

تاریخ، ساعت، روز و مقدار اندازه گیری شده فشارخون را ثبت کنید. به شکلی که فشارخون سیستولیک در بالا و فشارخون دیاستولیک در پایین باشد. از یک دفترچه کوچک جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده، استفاده کنید تا رجوع به آن آسان باشد

اگر در یکبار اندازه گیری، فشارخون شما بالا بود، خیلی نگران نباشید، فشارخون شما بطور طبیعی در طول شبانه روز تغییر می کند و اگر شما در مورد موضوعی نگران باشید، ممکن است فشارخون شما بالاتر برود. اگر فشار خون شما در یکبار اندازه گیری بالا بود، روز بعد چندین دفعه فشارخون خود را اندازه بگیرید تا ببینید که آیا مقادیر فشارخون شما همیشه بالاست یا خیر، سپس با پزشک مشورت نمایید.

دستگاه فشارخون خود را در محلی قرار دهید که دسترسی به آن آسان باشد