

## بیماری سل



### **افراد دارای علامت سرفه بیش از دو هفته حتما جهت نمونه برداری به مراکز بهداشتی مراجعه نمایند**

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه، رئیس گروه بیماری های معاونت بهداشتی ضمن اشاره به این موضوع گفت: در صورت عدم تشخیص و درمان، این بیماری عوارض شدیدی از خود بر جای می گذارد.

دکتر اسدیان افزود: افرادی که سرفه بیش از دو هفته دارند و همچنین مبتلایان به کرونا که بعد از بهبودی سرفه مزمن دارند، بایستی از نظر این بیماری بررسی شوند.

وی ادامه داد: این افراد با مراجعه به نزدیک ترین مرکز بهداشتی محل سکونت خود می توانند آزمایش نمونه خلط سه نوبته بدهند. این نمونه ها برای بررسی به آزمایشگاه تشخیص سل شهرستان مراغه ارسال می شوند.

در ادامه دکتر اسدیان سرفه مزمن، بی اشتها، کاهش وزن و همچنین ضعف و بی حالی را از مهم ترین علائم بیماری سل دانست و افزود: این بیماری با آزمایش خلط در سه نوبت که بصورت رایگان در تمامی مراکز بهداشتی نمونه برداری انجام می شود قابل تشخیص است.

رئیس گروه بیماری های معاونت بهداشتی گفت: افراد مبتلا به این بیماری با مصرف مرتب دارو کاملا درمان میشوند و دارو های لازم بصورت رایگان بعد از تشخیص در اختیار افراد مبتلا به بیماری سل قرار داده می شود. این بیماری بعد از دو هفته از مصرف صحیح دارو از طریق قطرات تنفسی قابل انتقال نیست.